



Lähtökohtaisesti tarpeettomia röntgentutkimuksia

Traumatilanteet:

Kylkiluut

- Kylkiluumurtuman diagnoosi on kliininen ja murtumakomplikaatiot todetaan tavallisella keuhkokuvausella. Sen sijaan destruktio/tuumori/myelooma-indikaatioilla kuvat on syytä ottaa.

Nenäluu

- Murtuma hoidetaan kliinisen kuvan mukaan ja reponointi ilman kuvaa kun turvotus on laskenut.

Häntäluu

- Kuvaus ei vaikuta hoitoon.

Kalloröntgen/Kasvojen luut

- Mikäli vamma indisoi kuvantamista, on suositeltavin tutkimus tietokonetomografia.

Lasten kuvantaminen:

Thorax

- Lähtökohtaisesti PA-kuva riittää (infektio/astma). Havaitun pneumonian paranemista ei tarvitse todentaa kuvantamisella, jos lapsi paranee normaalisti. Etu- ja sivukuva tarpeen kun sydänthx, tbc, tuumoriepäily.

Nenän sivuontelot

- Alle kouluikäisillä on harvoin tarpeen ja vanhemmilta yksi etukuva (kuutamoprojektio).

Kitarisakuvaus

- On korvalääkäreiden mukaan tarpeeton kuvaus.

Kallokuvat

- Ainoastaan kasvuhäiriö- ja pahoimpitelyepäilyssä, erikoissairaanhoidossa.

Raajojen ja nivelten kuvat

- Vain kliinisesti sairas alue, ei koko raajaa. Viistokuvia tai terveen puolen kuvausta ei suositella.

Lonkan alue

- UÄ on ensisijainen menetelmä.

Selkäranka

- Pitkittyneen selkävun selvittämiseksi kertaalleen anomalian tai nikamaliukuman diagnostiikkaan.

Natiivimahakuva

- Indikaatioita on kolme: okklusio, perforaatio, vierasesine. Ei ummetus.