



ULTRAÄÄNITUTKIMUKSIIN TULEVIEN POTILAIDEN ESIVALMISTELUT OSASTOLLA

- KARKEANEULABIOPSIAT (MAKSA, MUNUAISET)
- VATSANALUEEN OHUTNEULABIOPSIA (ONB)

P-TT –SPA arvo yli 50% (normaaliarvot 70 – 130) tai Marevan hoidossa olevat potilaat **INR alle 1,5** (edelliseltä päivältä) + tarkista veriarvot HB, trombosyytit (>100) (normaaliarvot 150 – 400)

- PLEURAPUNKTIOT ja -DREENIT
- VATSANALUEEN ASCITESPUNKTIOT ja -DREENIT

P-TT -SPA arvo yli 50% tai (Marevan) **INR enintään 1.8** (edelliseltä päivältä) ja trombosyytit mielellään yli 100, mutta 50-100 arvolla voi vielä pistää. Jos mahdollista, niin hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet tauotetaan lääkekohtaisen ohjeen mukaan. ASA:a ei tarvitse tauottaa.

Potilaan tulee olla ravinnotta (6 tuntia syömättä ja 2 tuntia juomatta) tutkimuspäivän aamusta, ei välttämättä pleurapunktiossa.

Potilas tuodaan omalla sängyllä uä / rtg-osastolle.

Esilääke vuodeosastolla n. 30 min ennen tutkimusta OXYNORM 10 mg/per os TAI osastolääkärin harkinnan mukaan, varmista lääkeherkkyys.

Laboratorio näytteenotot / viljelyt tehdään ennen klo 14.00.

Kiinnitysteline esim. virtsapussiin mukaan osastolta.

Mikäli on tiedossa, että potilaalla on MRSA tai veriteitse tarttuva tauti, on siitä EHDOTTOMASTI informoitava tutkimukseen osallistuvaa henkilökuntaa.

Osaton tulee huolehtia, että potilas tuodaan ajoissa tutkimukseen sekä tehdä näytteitä varten tarvittavat laboratoriolähetteet ascites- tai pleurapunktioon.

TUTKIMUKSEN JÄLKEEN POTILAS SEURANNASSA OSASTOLLA

- **Pleurapunktio:** potilas palaa osastolle lepäämään ja 3 tunnin kuluttua otettava kontrolli THX-rtg.
- **Vatsanalueen biopsia sekä ascitespunktio:** potilas vuorokauden ajan sairaalassa, vuodelepo ensimmäiset 6 tuntia. Vuotovaaran johdosta RR + pulssi seuranta ½ tunnin välein 2 tunnin ajan, minkä jälkeen tunneittain 4 tunnin ajan.
- **PNB-näytteenotto:** pistoskohta pidettävä kuivanan kaksi vuorokautta.