



VIRTSATEIDEN CT-TUTKIMUS

Tietokonetomografia (CT / TT) on tutkimus, jossa käytetään röntgensäteitä ja tietokonelaskentaa kuvien aikaansaamiseksi.

Tutkimukseen valmistautuminen

SINUN TULEE KÄYDÄ LABORATORIOSSA 3-14 VUOROKAUTTA ENNEN CT-TUTKIMUSTA KREATIINIARVON MÄÄRITTÄMISTÄ VARTEN.

Tämä tarvitaan tutkimuksessa mahdollisesti käytettävän varjoaineen vuoksi.

Voit ottaa lääkärin sinulle määräämät lääkkeet, **paitsi metformiinia sisältävät tablettihoitoiset diabeteslääkkeet** (esim. Avandament, Diformin, Glucophage, Janumet, Metforem, Oramet). Näissä tapauksissa **metforminlääkitys on lopetettava tutkimuspäivän aamuna.**

Jos tutkimuksen yhteydessä annetaan suonensisäisesti varjoainetta, metforminlääkityksen saa aloittaa uudelleen kolmen vuorokauden kuluttua eli tutkimuspäivä mukaan lukien lääkityksessä on neljän päivän tauko. Sinun tulee tarvittaessa sopia lääkärisi kanssa diabeteksesi hoidosta tämän lääkitystauon aikana.

Raskaana olevalle tutkimusta ei tehdä.

Lisäksi ilmoita röntgenosaston henkilökunnalle, jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta, sytostaattihoito meneillään tai varjoaineallergia.

Tutkimuksen kulku

Varaa tutkimukseen aikaa n. 1 tunti

Virtsarakossa tulee olla virtsaa tutkimuksen aikana, älä tyhjennä rakkoa 1-2 tuntiin ennen tutkimusta.

Tutkimuksessa voidaan käyttää laskimoon ruiskutettavaa suonensisäistä varjoainetta, joka erittyy pois virtsan mukanaan. Tutkimuksen jälkeen on hyvä nauttia nestettä (vettä, muhua yms.). Syödä ja liikkua voi normaalisti.

Opetussairaala

Sairaalamme on opetussairaala ja terveydenhuollon eriaisteiset opiskelijat osallistuvat potilaiden tutkimuksiin. Halutessasi voit kieltää opiskelijoiden osallistumisen omaan tutkimukseesi.