



22.1.2019

Valmisteluohje osastoille ja poliklinikoille – ultraääniohjatut karkeaneulanäytteet, Tays Hatanpää

Esivalmistelu:

Potilaalta otetaan vuotoarvot 1 vrk ennen syviä (maksan, vatsanontelon tuumorit) paksuneulabiopsioita. P-TT-INR arvon tulee olla <1,5 ja B-trombosyyttitaso >100 x 10⁹/l. Huomioikaa veren hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden tauottaminen.

Ennen näytteenottoa potilaan on oltava ravinnotta vähintään 6 tuntia.

Potilaalle laitetaan osastolla ennen kuvantamiseksi tuomista käden laskimoon aukiolotippa ja pistetään hiljalleen (noin 30-40 ml/tunnissa) tippumaan Ringeriä.

Rauhoittava esilääkitys on suositeltava.

Laboratorio näytteenotot / viljelyt tehdään Hatanpäällä ennen klo 14.00.

Lähtävän yksikön pitää tehdä näytteitä varten tarvittavat laboratoriolähetteet

Kontraindikaatiot:

Levoton potilas, hoitamaton hyytymishäiriö.

Toimenpiteen suoritus:

Näytteenottoalue puudutetaan. Radiologi ottaa leikkaavalla neulalla tutkittavasta elimestä näytteitä, jotka lähetetään tutkittaviksi.

Jälkihoito:

Paksuneulabiopsian jälkeen potilaan on oltava vuodelevossa ja ravinnotta 4-6 tuntia.

Potilaan yleistilaa, verenpainetta, pulssia sekä mahdollista vuotoa pistoalueelta seurataan. Potilaalla on oltava seuralainen yön yli.