



5.7.2019

Valmisteluohje osastoille ja poliklinikoille pleurapunktioihin, ascitespunktioihin ja -dreneeraukseen, Tays Hatanpää

Esivalmistelu:

Potilaalta otetaan vuotoarvot 1 vrk ennen toimenpiteitä. P-TT-INR arvon tulee olla <1,8 ja B-trombosyyttitaso > 100x 10⁹/l. Huomioikaa veren hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden tauottaminen.

Ennen näytteenottoa potilaan on oltava ravinnotta vähintään 6h, ei pleurapunktiossa.

Kanyyli käteen ennen tutkimusta. Rauhoittava esilääkitys on suositeltava.

Laboratorio näytteenotot / viljelyt tehdään Hatanpäällä ennen klo 14.00.

Lähetettävän yksikön pitää tehdä näytteitä varten tarvittavat laboratoriolähetteet.

Kontraindikaatiot:

Levoton potilas, hoitamaton hyytymishäiriö

Toimenpiteen suoritus:

Potilas tuodaan sängyllä tutkimukseen. Toimenpidekohta puudutetaan. Radiologi laittaa dreenin tai ottaa ultraääniohjauksessa tutkittavasta nesteestä punktionäytteitä, jotka lähetetään tutkittavaksi.

Jälkihoito:

Vuodelepo ja ravinnotta 4-6 tuntia. Potilaan yleistilaa, verenpainetta, pulssia sekä mahdollista vuotoa pistoalueelta seurataan.

Ascitespunktio-potilas vuorokauden ajan sairaalassa.

Pleurapunktio: 3 tunnin kuluttua otettava kontrolli THX-rtg. Potilaalla on oltava seuralainen yön yli.